

Quand faut-il être à jeun ?

A jeun strictement = Prélèvement 12 heures après ingestion d'aliments (eau autorisée)	Obligatoire pour : Triglycérides, Cholestérol, LDL-cholestérol, HDL-cholestérol, Glycémie, Fer/ coefficient de saturation à la transferrine, Glucose urinaire Cryoglobuline
---	--

Exceptions :	Urgence, Glycémie post-prandiale.
--------------	-----------------------------------

Quand faut-il prendre ses médicaments ?

Après le prélèvement si dosage des médicaments

A quel moment de la journée faire le prélèvement ?

Entre 7h et 10h le matin (recommandé mais non obligatoire)	Cortisol 8h et selon les recommandations de votre médecin
Avant 12h (recommandé mais non obligatoire)	Autres analyses
Exceptions :	Urgence, Dialyse, Bilan préopératoire

Quand faut-il être à jeun ?

A jeun strictement = Prélèvement 12 heures après ingestion d'aliments (eau autorisée)	Obligatoire pour : Triglycérides, Cholestérol, LDL-cholestérol, HDL-cholestérol, Glycémie, Fer/ coefficient de saturation à la transferrine, Glucose urinaire Cryoglobuline
---	--

Exceptions :	Urgence, Glycémie post-prandiale.
--------------	-----------------------------------

Quand faut-il prendre ses médicaments ?

Après le prélèvement si dosage des médicaments

A quel moment de la journée faire le prélèvement ?

Entre 7h et 10h le matin (recommandé mais non obligatoire)	Cortisol 8h et selon les recommandations de votre médecin
Avant 12h (recommandé mais non obligatoire)	Autres analyses
Exceptions :	Urgence, Dialyse, Bilan préopératoire